

CECHY ROLNICZE

REJESTRACJA: POLSKA 2016

Wigor jesienny	Bardzo dobry
Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej	Średnia
Zimotrwałość	Bardzo dobra
Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej	Średniopóźna
Termin kwitnienia	Średniowczesny
Termin dojrzwania	Średniopóźny
Wysokość roślin	Średniowysokie
Odporność na wyleganie	Wysoka
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych	Dobra
Odporność na pęknięcie łuszczyń i osypywanie się nasion	Doskonała
Zawartość tłuszczu w nasionach	Bardzo wysoka




WYNIKI PLONOWANIA

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2019 – średni plon

6 lokalizacji z 9 testowanymi odmianami



Doświadczenia PDO COBORU 2017
– 105% wzorca



Doświadczenia łanowe DEKALB 2018
7 lokalizacji z 9 testowanymi odmianami

KLUCZOWE CECHY



TOLERANCJA NA KIŁĘ KAPUSTY

Odmiana do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych stanowiskach glebowych.



WYSOKI PLON

Najwyższy potencjał plonowania w segmencie. 105% wzorca w Doświadczeniach PDO COBORU 2017. W doświadczeniach łanowych DEKALB 2019 najwyższy plon osiągnęła w miejscowości Drogoszcze - 4,23 t/ha.



WIGOR WIOSENNY

Odmiana zdolna do szybszej regeneracji po zimie na skutek szybkiego przyrostu biomasy.



ZIMOTRWAŁOŚĆ

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy.

REKOMENDACJE

- Termin siewu: optymalny lub opóźniony. Należy unikać wczesnego terminu siewu. Przyspieszenie siewu w nadmiernie ogrzanej i wilgotną glebę zwiększa ryzyko infekcji roślin. Norma wysiewu **50 nasion/m²**, by uzyskać docelową obsadę **45 roślin/m²**.
- Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.
- Stanowiska glebowe: stanowiska porażone kiłą kapusty niezależnie od typu gleby. Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.

DK PLATINIUM – ODPOWIEDŹ NA KIŁĘ KAPUSTY

DK PLATINIUM zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych kiłą kapusty stanowiskach glebowych. Ma dobry wigor jesienny, w sprzyjających warunkach dość szybko rośnie, dlatego należy pamiętać o jej skracaniu, tak by uniknąć elongacji szyjki korzeniowej. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość, średniowczesnie kwitnie i dojrzewa. Dodatkowym jej atutem jest bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Poza tym, z powodu występowania choroby na stanowisku glebowym, należy zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m². Trzeba pamiętać, że lepiej jest opóźnić siew niż go przyspieszyć, ponieważ przyspieszenie może zwiększyć ryzyko infekcji roślin, zwłaszcza przy nadmiernym ogrzaniu i uwilgotnieniu gleby.



ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ

Dział Rozwoju Produktu, DEKALB